



ANÁLISIS POLÍNICO MIEL

Fecha recepción: 22-09-2025

Nº muestra: M_25_117

Cliente: Jexika de la Fuente Ferreras (Miel Miye)

Procedencia: Santa Cristina de Valmadrigal (León)

Fecha análisis: 26-09-2025

Tipo Análisis: COMPLETO CA
HUM, COND

POLEN DOMINANTE (>45%)	
POLEN DE ACOMPAÑAMIENTO (16-45%)	<i>T. Vicia sativa</i> (22,9%), <i>T. Raphanus raphanistrum</i> (17,5%)
POLEN AISLADO (3-15,9%)	<i>T. Centaurea calcitrapa</i> (13,6%), <i>T. Helianthus annuus</i> (5,2%), <i>Salix</i> sp. (5,2%), <i>Quercus rotundifolia</i> (3,8%), <i>Trifolium pratense</i> (3,4%), <i>T. Rubus ulmifolius</i> (3,1%)
PRESENCIA (0-2,9%)	<i>T. Lotus creticus</i> , <i>T. Lamium amplexicaule</i> , <i>T. Scrophularia canina</i> , <i>Centaurea cyanus</i> , <i>T. Cytisus scoparius</i> , <i>T. Papaver rhoeas</i> , <i>T. Bellis perennis</i> , <i>T. Medicago scutellata</i> , <i>T. Trifolium repens</i> , <i>T. Capsella bursa-pastoris</i> , <i>Datura</i> sp., <i>Echium</i> sp., <i>T. Taraxacum officinale</i> , <i>Zea mays</i> , <i>T. Anthemis arvensis</i> , <i>Centaurea cephalariifolia</i> , <i>T. Convolvulus arvensis</i> , <i>T. Orlaya daucoides</i> , <i>Plantago</i> sp., <i>Chenopodiaceae</i> , <i>Cyperaceae</i> , <i>Helianthemum</i> sp., <i>T. Lavandula stoechas</i> , <i>T. Medicago sativa</i> , <i>T. Rumex conglomeratus</i> , <i>T. Scandix pecten-veneris</i> , <i>T. Thymus</i>

ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS	
HUMEDAD	14,8 %
pH	3,92
ACIDEZ LIBRE	22,00 meq/kg

Conclusión: Miel multifloral.

Técnico Investigador:

M^a Rosa García Rogado

Los resultados aparecen con el nombre científico y algunos de ellos están precedidos de "T." que significa tipo polínico. El tipo polínico engloba diferentes especies cuyo polen comparte los mismos caracteres morfológicos y se denomina por el nombre de la especie más característica de las que lo componen.

Los resultados del presente análisis sólo corresponden a la muestra analizada.

Tabla 1. Géneros o especies incluidos en los tipos polínicos identificados en la muestra.

Los táxones que conforman cada tipo polínico son sólo una referencia y pueden variar dependiendo del origen geográfico.

TIPO POLÍNICO	TAXONES
<i>Anthemis arvensis</i>	<i>Achillea</i> sp., <i>Anacyclus clavatus</i> , <i>Anthemis arvensis</i> , <i>A. cotula</i> , <i>Chamaemelum nobile</i> , <i>Leucanthemum</i> sp., <i>Matricaria</i> sp., <i>Santolina</i> sp., <i>Tanacetum</i> sp.
<i>Bellis perennis</i>	<i>Aster</i> sp., <i>Asteriscus</i> sp., <i>Bellis perennis</i> , <i>B. sylvestris</i> , <i>Bombycilaena discolor</i> , <i>B. erecta</i> , <i>Conyza canadensis</i> , <i>Chiliadenus glutinosus</i> , <i>Dittrichia graveolens</i> , <i>D. viscosa</i> , <i>Eupatorium cannabinum</i> , <i>Filago</i> sp., <i>Gnaphalium</i> sp., <i>Helichrysum</i> sp., <i>Inula</i> sp., <i>Jasonia tuberosa</i> , <i>Pallenis spinosa</i> , <i>Phagnalon</i> sp., <i>Pulicaria</i> sp.
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	<i>Arabis auriculata</i> , <i>Biscutella auriculata</i> , <i>Brassica oxyrrhina</i> , <i>Capsella bursa-pastoris</i> , <i>Erophila verna</i> , <i>Lobularia maritima</i> , <i>Rapistrum rugosum</i>
<i>Centaurea calcitrapa</i>	<i>Atractylis</i> sp., <i>Centaurea alba</i> subsp. <i>alba</i> , <i>C. aspera</i> , <i>C. calcitrapa</i> , <i>C. jacea</i> , <i>C. melitensis</i> , <i>C. nigra</i> , <i>C. ornata</i> , <i>C. solstitialis</i>
<i>Chenopodiaceae</i>	<i>Chenopodiaceae</i> y <i>Amaranthaceae</i>
<i>Convolvulus arvensis</i>	<i>Convolvulus arvensis</i> , <i>C. lineatus</i>
<i>Cytisus scoparius</i>	<i>Adenocarpus</i> sp., <i>Cytisus</i> sp., <i>Genista</i> sp., <i>Stauracanthus genistoides</i> , <i>Ulex</i> sp.
<i>Helianthus annuus</i>	<i>Helianthus annuus</i> , <i>Bidens</i> sp.
<i>Lamium amplexicaule</i>	<i>Ajuga</i> sp., <i>Ballota</i> sp., <i>Lamium</i> sp., <i>Scutellaria</i> sp., <i>Stachys</i> sp.
<i>Lavandula stoechas</i>	<i>Lavandula pedunculata</i> , <i>L. stoechas</i>
<i>Lotus creticus</i>	<i>Anthyllis vulneraria</i> , <i>Dorycnium</i> sp., <i>Lotus conimbricensis</i> , <i>Lotus corniculatus</i> , <i>L. pedunculatus</i> , <i>L. subbiflorus</i> , <i>Trifolium glomeratum</i> , <i>Trigonella monspeliaca</i>
<i>Medicago sativa</i>	<i>M. orbicularis</i> , <i>M. sativa</i> , <i>Trifolium fragiferum</i> , <i>T. striatum</i>
<i>Medicago scutellata</i>	<i>Medicago doliata</i> , <i>M. scutellata</i>
<i>Orlaya daucoides</i>	<i>Daucus</i> sp., <i>Foeniculum vulgare</i> , <i>Oenanthe globulosa</i> , <i>Orlaya daucoides</i> , <i>Tordylium maximum</i> , <i>Torilis arvensis</i>
<i>Papaver rhoeas</i>	<i>Chelidonium majus</i> , <i>Eschscholzia californica</i> , <i>Papaver dubium</i> , <i>P. hybridum</i> , <i>P. rhoeas</i> , <i>P. somniferum</i>
<i>Raphanus raphanistrum</i>	<i>Alyssum</i> sp., <i>Arabidopsis thaliana</i> , <i>Brassica napus</i> , <i>Cardaria draba</i> , <i>Coronopus</i> sp., <i>Eruca</i> sp., <i>Hirschfeldia incana</i> , <i>Hornungia petraea</i> , <i>Lepidium</i> sp., <i>Nasturtium officinale</i> , <i>Neslia paniculata</i> , <i>Raphanus raphanistrum</i> , <i>Sisymbrella aspera</i> , <i>Sisymbrium</i> sp.
<i>Rubus ulmifolius</i>	<i>Rubus</i> sp.
<i>Rumex conglomeratus</i>	<i>Rumex</i> sp.
<i>Scandix pecten-veneris</i>	<i>Ammi majus</i> , <i>Conopodium</i> sp., <i>Ligusticum lucidum</i> , <i>Oenanthe crocata</i> , <i>O. fistulosa</i> , <i>O. lachenalii</i> , <i>O. pimpinelloides</i> , <i>Peucedanum</i> sp., <i>Pimpinella</i> sp., <i>Scandix</i> sp., <i>Thapsia</i> sp.
<i>Scrophularia canina</i>	<i>Antirrhinum</i> sp., <i>Cymbalaria muralis</i> , <i>Digitalis</i> sp., <i>Linaria</i> sp., <i>Scrophularia</i> sp.



<i>Taraxacum officinale</i>	<i>Andryala</i> sp., <i>Chondrilla juncea</i> , <i>Crepis</i> sp., <i>Hedypnois</i> sp., <i>Hypochaeris</i> sp., <i>Lapsana communis</i> , <i>Leontodon</i> sp., <i>Picris</i> sp., <i>Reichardia</i> sp., <i>Sonchus</i> sp., <i>Taraxacum</i> sp., <i>Urospermum picroides</i>
<i>Thymus</i>	<i>Acinos</i> sp., <i>Calamintha</i> sp., <i>Clinopodium vulgare</i> , <i>Lycopus</i> sp., <i>Melissa officinalis</i> , <i>Mentha</i> sp., <i>Thymus</i> sp.
<i>Trifolium repens</i>	<i>Hippocrepis</i> sp., <i>Medicago arabica</i> , <i>M. lupulina</i> , <i>M. minima</i> , <i>M. polymorpha</i> , <i>M. truncatula</i> , <i>Scorpiurus</i> sp., <i>Trifolium dubium</i> , <i>T. repens</i>
<i>Vicia sativa</i>	<i>Lathyrus</i> sp., <i>Vicia</i> sp.